


• پاروتیدکتومی چیست؟

پاروتیدکتومی به معنای برداشت غده پاروتید است که ۲ نوع دارد.

تومورهای بخش سطحی پاروتید اغلب در سطح غده تشکیل شده و

این مواقع صورت می‌پذیرد.
superficial subtotal parotidectomy در

تومورهای عمقی اغلب بدخیم بوده و نیاز به پاروتیدکتومی دارد در طول جراحی باید مراقب عصب facial بود.



• اندیکاسیون

پاروتیدکتومی در موارد زیر اندیکاسیون دارد:

۱. تشکیل سنگ های مجرای stenon's

۲. تومور های خوش خیم و بدخیم

۳. در مواردی که تعداد سنگ های مجرای stenon's کم و کوچک باشد انجام پاروتیدکتومی لزومی ندارد و تخلیه سنگ ها از مجرا کفایت می‌کند اما در مواردی که تعداد سنگها زیاد است، پاروتیدکتومی اندیکاسیون می‌یابد.

• مراحل جراحی

۱. یک برش پوستی در قسمت قدامی گوش زده می‌شود. فرد اسکراب می‌تواند با هوک پوستی، پوست را کنار بزند.

۲. اتصالات بین غده پاروتید و عضله استرنوکلوئیدوماستوئید با کمک قیچی متر و کوتر جدا می‌گردد.

۳. غده پاروتید از اتصالاتش با کانال گوش خارجی جدا شده؛ جراح باید مراقب آسیب به عصب فیشیال باشد.

۴. سپس لوب سطحی غده پاروتید توسط موسکیتو و کوتر جدا می‌گردد.

۵. در مواردی که قصد برداشت غده پاروتید را نیز داریم توسط موسکیتو کوتر انرا از عصب جدا می‌نماییم.

۶. غده پاروتید همچنین از اتصالاتش با عضله ماستر آزاد و خارج می‌شود.

۷. ناحیه جراحی با نرمال سالین شستشو داده شده و زخم بسته میشود. یک درن در موضع قرار داده می‌شود.

• مراقبت های بعد عمل

۱. بالا آوردن سر تخت به کاهش تورم کمک خواهد کرد.

۲. بیمار پس از حدود ۲_۳ هفته به فعالیت طبیعی خود باز خواهد گشت.

• نوع بی هوشی

Ga

• پوزیشن

سوپاین





پاروتیدکتومی



تهیه و تنظیم: هدیه کارگر
استاد مربوطه: خانم رضایی کیا

۵. ضعف و فلج شدن ماهیچه صورت

۶. اختلال در صحبت کردن

• علل تومور پاروتید

۱. قرار گیری در معرض اشعه ایکس

۲. عدم رعایت بهداشت دهان و دندان

۳. مصرف بالای دخانیات

۴. تغییرات ژنتیکی

• نحوه تشخیص

۱. ازمایش یا معاینه فیزیکی

۲. نمونه برداری از بافت

۳. تصاویر رادیولوژی

• ابزار

چراغ پیشانی، ساکشن، کوتر، ست جراحی گردن، رایت انگل، هوک عصبی، هوک پوستی، پری ست، تیغ، ۱۰ و ۱۵، سرنگ، نخ.

• پرپ

طرف مورد نظر صورت از خط رویش موها تا زیر شانه ها پرپ می‌گردد.

• درپ

به گونه ای که فقط ناحیه پاروتید مشخص گردد.

• نحوه تشخیص

۱. ازمایش یا معاینه فیزیکی

۲. نمونه برداری از بافت

۳. تصاویر رادیولوژی

• علائم

۱. بی حس شدن صورت

۲. درد ناگهانی صورت و گردن

۳. کاهش وزن بدون دلیل

۴. تورم غده پاروتید